



Diagnostic : \_\_\_\_\_  
 Aucune allergie connue : [ ]  
 (à cocher obligatoirement si applicable)  
 Allergies : \_\_\_\_\_  
 Intolérances : \_\_\_\_\_  
 Poids (kg) : \_\_\_\_\_ Taille (cm) : \_\_\_\_\_ SC (m²) : \_\_\_\_\_  
 Âge gestationnel (sem) : \_\_\_\_\_ Poids à la naissance (kg) : \_\_\_\_\_

*Feuille d'ordonnance pré-rédigée (FOPR) individuelle OU collective*  
**FOPRI – 0141 – Soins palliatifs – Protocole de détresse pour patients à domicile (1 de 1)**

Espace infirmier

**DÉTRESSE** : dyspnée, douleur, hémorragie, anxiété intense et aiguë

**Le niveau de soins est clairement statué avec le patient et/ou sa famille et l'objectif de traitement est le confort, sans tentative de réanimation cardiorespiratoire ni intubation.**

**Le médecin traitant ou l'équipe de garde doit être contacté dès que le protocole est débuté afin d'ajuster les doses de médicaments au besoin et de discuter des bénéfices ou non de transférer le patient à l'hôpital.**

Le traitement de la détresse se fait à l'aide d'un opiacé (morphine), qui est un bon analgésique et qui enlève la sensation de dyspnée et d'étouffement, associé à une benzodiazépine (midazolam), qui est un bon anxiolytique et agit sur l'état de conscience. Un anticholinergique (scopolamine ou glycopyrrolate) est administré lorsque les sécrétions respiratoires sont abondantes.

**Midazolam** \_\_\_\_\_ mg **sous-cutané** aux 20 minutes PRN pour 2 doses, puis réévaluer  
 Patient qui ne reçoit pas de benzodiazépines : **0,1 mg/kg/dose (max 5 mg/dose)**  
 Patient qui reçoit des benzodiazépines de façon régulière : **0,15 mg/kg/dose (max 10 mg/dose)**  
**Servir : 2 seringues de midazolam 5 mg/mL avec aiguille**

**ET**

**Morphine** \_\_\_\_\_ mg **sous-cutané** aux 20 minutes PRN pour 2 doses, puis réévaluer  
 Patient qui ne reçoit pas de morphine : **0,1 mg/kg/dose (max 5 mg/dose)**  
 Patient qui reçoit de la morphine de façon régulière, **donner 10% de la dose journalière.** Si cette dose est orale, convertir en dose sous-cutanée en donnant 50% de la dose orale. **(min 0,1 mg/kg/dose SC, max 20 mg/dose)**  
**Servir : 2 seringues de morphine 10 mg/mL avec aiguille**

**INSUFLON** : Installer Insuflon(s) après administration des premières doses de midazolam et de morphine si des doses répétées de médicaments sous-cutanés sont prévues, afin d'optimiser le confort du patient.  
 Volume maximal de 2 mL par site d'injection.  
**Servir : 3 insuflons**

**SI SÉCRÉTIONS RESPIRATOIRES abondantes :**

**Scopolamine** \_\_\_\_\_ mg **(0,006 mg/kg/dose, max 0,3 mg/dose) sous-cutané** aux 20 minutes PRN pour 2 doses, puis réévaluer  
 (A favoriser si effet sédatif souhaité; contre-indiqué si patient à risque de convulsion ou connu épileptique)  
**Servir : 2 seringues de scopolamine 0,4 mg/mL avec aiguille**

**OU**

**Glycopyrrolate** \_\_\_\_\_ mg **(0,004 mg/kg/dose, max 0,3 mg/dose) sous-cutané** aux 20 minutes PRN pour 2 doses, puis réévaluer  
**Servir : 2 seringues de glycopyrrolate 0,2 mg/mL avec aiguille**

Relevé et télécopié à la pharmacie par :  Date :                      Heure :	Signature du médecin ou professionnel autorisé à prescrire	Date et heure  No. de permis
---	--	------------------------------------

*Ces ordonnances ne peuvent être exécutées qu'au département de pharmacie du CHU Ste-Justine  
 La présence de carrés (☐) indique un choix à cocher obligatoirement lorsqu'applicable  
 La présence de [FADM] est une notation réservée à l'usage de la pharmacie*

